




Epidermale differentiatiestoonissen

Advies per type EDD

In onderstaande tabel is het huidtherapeutisch advies per type EDD weergegeven (Mazereeuw-Hautier, et al., 2025).

Type (genetische naam)	Vroegere naam	Kenmerken	Aanbevelingen voor huidtherapie
TGMI-nEDD	Lamellaire ichthyosis	Collodion baby, dikke schilfers, bathing suit verdeling	Dagelijks vet houden, badtherapie met olie, keratolytica (voorzichtig), voorkomen oververhitting, ectropionzorg (Ectropion is een naar buiten gedraaid onderooglid)
ABCA12-nEDD	Harlequin ichthyosis	Zeer ernstige hyperkeratose, fissuren, ectropion	Steriel insmeren (3-8x/dag), wondzorg, infectiecontrole, fysiotherapie, oog- en mondzorg
FLG-nEDD	Ichthyosis vulgaris	Fijne schilfering, droge huid, atopie	Dagelijks emolliëntia, milde reiniging, atopie-educatie, vermijden irriterende stoffen
KRT1/KRT10- nEDD (epidermolytic)	Epidermolytische hyperkeratose	Blaren bij geboorte, later verdikking	Wondzorg, natverbanden, keratolytica, pijnbestrijding, kledingadvies
CDSN-nEDD / CSTA-nEDD	Peeling Skin Syndrome	Oppervlakkige schilvering (met/zonder erytheem)	Zachte emolliëntia, natverbanden bij jeuk/pijn, psychosociale steun
ALOX12B / ALOXE3 / PNPLA1 / CYP4F22-nEDD	ARCI (congenitale ichthyosis)	Collodion baby, later lamellaire of rode huid	Vetinbrengende zalven, badtherapie, vermijden actieve stoffen, voedingsmonitoring
SLC27A4-nEDD	Ichthyosis Prematurity Syndrome	Prematuriteit, ademproblemen, milde schilfering	Milde huidzorg, monitoren van voeding en ademhaling, herstel barrièrefunctie
ATP2C1-nEDD / ATP2A2-nEDD	Ziekte van Hailey-Hailey / Darier	Erosies in plooien, infecties	Plooien droog houden, antiseptica, antimycotica, verkoelende kompressen
GJB3 / GJB4 / GJA1-nEDD	Erythrokeratodermia variabilis	Migrerende rode plaques met schilfering	Hydratatie, uitleg over fluctuaties, hitte-intolerantie begeleiden